

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 2018 г.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВИЧ ЗА 2017 ГОД

В 2017 г. общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,9 [31,1–43,9] млн человек.

В 2017 г. 21,7 [19,1–22,6] млн людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии.

В 2017 г. число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,8 [1,4–2,4] млн.

В 2017 г. число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило 940 000 [670 000–1,3 млн] человек.

77,3 [59,9–100] млн человек заразились ВИЧ с начала эпидемии.

35,4 [25,0–49,9] млн человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней с начала эпидемии.

Люди, живущие с ВИЧ

- В 2017 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,9 [31,1–43,9] млн человек:
 - 35,1 [29,6–41,7] млн взрослых
 - 1,8 [1,3–2,4] млн детей (в возрасте до 15 лет)
- В 2017 г. 75% [55–92%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.
- Около 9,4 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ.

Люди, живущие с ВИЧ и получающие лечение в рамках антиретровирусной терапии

- В 2017 году 21,7 [19,1–22,6] млн человек, живущих с ВИЧ, получали лечение в рамках антиретровирусной терапии, что на 2,3 млн больше, чем в 2016 г., и выше показателя за 2010 г., составившего 8 [7,1–8,3] млн.
- В 2017 году 59% [44–73%] всех людей, живущих с ВИЧ, получили доступ к лечению.
 - 59% [44–73%] взрослых в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, и 52% [37–70%] детей в возрасте 0–14 лет получили доступ к лечению.
 - 65% [49–80%] взрослых женщин в возрасте 15 лет и старше имели доступ к лечению, в то время как только 53% [38–66%] взрослых мужчин в возрасте 15 лет и старше имели доступ.

- В 2017 году 80% [61– >95%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, получили доступ к лечению с применением антиретровирусных препаратов с целью предотвращения передачи вируса плоду.

Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией

- Число новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 47% по сравнению с 1996 годом, когда этот показатель достиг пикового значения.
 - В 2017 году число новых случаев заражения ВИЧ снизилось до 1,8 [1,4–2,4] млн по сравнению с 3,4 [2,6–4,4] млн в 1996 году.
- В 2017 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, по оценкам, снизился на 16% относительно 2010 года, с 1,9 [1,5–2,5] млн до 1,6 [1,3–2,1] млн.
 - В 2017 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 35% относительно 2010 года, с 270 000 [170 000–400 000] до 180 000 [110 000–260 000].

Смертность вследствие СПИДа

- Показатель смертности вследствие СПИДа снизился на 51% относительно пикового показателя 2004 года.
 - В 2017 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДУ болезней составило 940 000 [670 000–1,3 млн] человек. Для сравнения в 2004 году этот показатель составлял 1,9 [1,4–2,7] млн человек и 1,4 [1–2] млн человек в 2010 году.

90–90–90

- В 2017 году трое из четырех человек (75%), живущих с ВИЧ, знали свой статус.
- Четверо из пяти человек (79%), знающих свой статус, имели доступ к лечению.
- Супрессия вирусной нагрузки наблюдалась у четверых из пяти человек (81%), пользующихся доступом к лечению.
- 47% всех людей, живущих с ВИЧ, имеют супрессию вирусной нагрузки.

Женщины

- Каждую неделю ВИЧ заражаются около 7000 молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет.
 - В странах Африки к югу от Сахары три из четырех новых случаев заражения среди подростков 15–19 лет приходятся на девушек. Вероятность того, что молодые женщины в возрасте от 15 до 24 лет живут с ВИЧ, вдвое выше по сравнению с мужчинами.
- Более трети женщин (35%) по всему миру сталкивались в своей жизни с физическим и/или сексуальным насилием.
 - В некоторых регионах вероятность того, что женщины, подвергшиеся насилию, были заражены ВИЧ, в полтора раза выше.

Ключевые группы риска

- На ключевые группы риска и их сексуальных партнеров приходится:
 - 47% новых случаев заражения ВИЧ по всему миру;
 - 95% новых случаев заражения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке;
 - 16% новых случаев заражения ВИЧ в странах Восточной и Южной Африки.
- Риск заражения ВИЧ:
 - в 27 раз выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами;
 - в 23 раза выше среди потребителей инъекционных наркотиков;
 - в 13 раз выше среди женщин, работающих в секс-индустрии;
 - в 12 раз выше среди женщин-транссексуалов.

ВИЧ/Туберкулез

- Туберкулез является основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, на него приходится около одной трети случаев смерти, связанных со СПИДом.
- В 2016 году туберкулезом заболело 10,4 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона людей, живущих с ВИЧ.
 - Люди, живущие с ВИЧ, не имеющие симптомов туберкулеза, нуждаются в профилактической терапии заболевания. Это уменьшает риск развития туберкулеза и сокращает смертность от туберкулеза/ВИЧ примерно на 40%.
- По оценочным данным 49% людей, живущих с ВИЧ и туберкулезом, не знают о своей коинфекции и поэтому не получают лечения.

Инвестиции

- По состоянию на конец 2017 года было выделено 21,3 млрд долл. США на борьбу со СПИДом в странах с низким и средним уровнями дохода.
 - Около 56% от общих ресурсов, выделенных на борьбу с ВИЧ в странах с низким и средним уровнями дохода в 2017 году, было получено из внутренних источников.
- По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на борьбу со СПИДом потребуется 26,2 млрд долл. США.

Глобальные данные по ВИЧ

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Люди, живущие с ВИЧ	27,4 млн [23,1 млн– 32,6 млн]	30,1 млн [25,4 млн– 35,8 млн]	32,4 млн [27,4 млн– 38,5 млн]	33,7 млн [28,4 млн– 40,0 млн]	34,3 млн [29,0 млн– 40,8 млн]	35,0 млн [29,5 млн– 41,6 млн]	35,6 млн [30,1 млн– 42,4 млн]	36,3 млн [30,6 млн– 43,1 млн]	36,9 млн [31,1 млн– 43,9 млн]
Новые случаи заражения ВИЧ (всего)	2,8 млн [2,2 млн– 3,7 млн]	2,5 млн [1,9 млн– 3,2 млн]	2,2 млн [1,7 млн– 2,9 млн]	2,1 млн [1,6 млн– 2,7 млн]	2,0 млн [1,6 млн– 2,7 млн]	2,0 млн [1,5 млн– 2,6 млн]	1,9 млн [1,5 млн– 2,5 млн]	1,9 млн [1,4 млн– 2,4 млн]	1,8 млн [1,4 млн– 2,4 млн]
Новые случаи заражения ВИЧ (в возрасте 15+)	2,4 млн [1,9 млн– 3,2 млн]	2,1 млн [1,6 млн– 2,7 млн]	1,9 млн [1,5 млн– 2,5 млн]	1,8 млн [1,4 млн– 2,4 млн]	1,8 млн [1,4 млн– 2,4 млн]	1,8 млн [1,4 млн– 2,3 млн]	1,7 млн [1,3 млн– 2,3 млн]	1,7 млн [1,3 млн– 2,2 млн]	1,6 млн [1,3 млн– 2,1 млн]
Новые случаи заражения ВИЧ (в возрасте 0–14)	420 000 [260 000– 620 000]	380 000 [240 000– 560 000]	270 000 [170 000– 400 000]	230 000 [150 000– 340 000]	220 000 [140 000– 320 000]	200 000 [120 000– 290 000]	190 000 [120 000– 280 000]	180 000 [110 000– 270 000]	180 000 [110 000– 260 000]
Смертность вследствие СПИДа	1,5 млн [1,1 млн– 2,2 млн]	1,9 млн [1,4 млн– 2,7 млн]	1,4 млн [1,0 млн– 2,0 млн]	1,2 млн [880 000– 1,7 млн]	1,2 млн [820 000– 1,6 млн]	1,1 млн [770 000– 1,5 млн]	1,0 млн [730 000– 1,5 млн]	990 000 [700 000– 1,4 млн]	940 000 [670 000– 1,3 млн]
Люди, получающие антиретровирусную терапию	611 000 [538 000– 636 000]	2,1 млн [1,8 млн– 2,1 млн]	8,0 млн [7,1 млн– 8,3 млн]	11,4 млн [10,1 млн– 11,9 млн]	13,2 млн [11,6 млн– 13,8 млн]	15,1 млн [13,3 млн– 15,7 млн]	17,2 млн [15,2 млн– 17,9 млн]	19,4 млн [17,1 млн– 20,2 млн]	21,7 млн [19,1 млн– 22,6 млн]
Ресурсы, выделенные на борьбу с ВИЧ (в странах с низким и средним уровнями дохода)	4,8 млрд долл. США*	9,4 млрд долл. США*	15,9 млрд долл. США*	18,8 млрд долл. США*	19,5 млрд долл. США*	19,2 млрд долл. США*	19,0 млрд долл. США*	19,1 млрд долл. США*	21,3 млрд долл. США*

* Страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2012 года.

* Страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2013 года.

Региональные данные за 2017 г.

Регион	Люди, живущие с ВИЧ 2017 г.	Новые случаи заражения ВИЧ, 2017 г.			Смертность вследствие СПИДа 2017 г.	Люди, получающие антиретровирусную терапию 2017 г.
		Total	Aged 15+	Aged 0–14		
Страны Восточной и Южной Африки	19,6 млн [17,5 млн–22,0 млн]	800 000 [650 000–1,0 млн]	710 000 [580 000–890 000]	92 000 [61 000–130 000]	380 000 [300 000–510 000]	12,9 млн [11,4 млн–13,4 млн]
Азиатско-Тихоокеанский регион	5,2 млн [4,1 млн–6,7 млн]	280 000 [210 000–390 000]	280 000 [210 000–390 000]	10 000 [7 400–14 000]	170 000 [110 000–280 000]	2,7 млн [2,4 млн–2,9 млн]
Западная и Центральная Африка	6,1 млн [4,4 млн–8,1 млн]	370 000 [220 000–570 000]	310 000 [180 000–470 000]	67 000 [36 000–100 000]	280 000 [180 000–410 000]	2,4 млн [2,1 млн–2,5 млн]
Латинская Америка	1,8 млн [1,5 млн–2,3 млн]	100 000 [77 000–130 000]	99 000 [75 000–130 000]	2400 [1800–3600]	37 000 [26 000–51 000]	1,1 млн [992 000–1,2 млн]
Карибский бассейн	310 000 [260 000–420 000]	15 000 [11 000–26 000]	14 000 [10 000–24 000]	1100 [710–1 900]	10 000 [7 100–17 000]	181 000 [159 000–188 000]
Ближний Восток и Северная Африка	220 000 [150 000–300 000]	18 000 [10 000–31 000]	17 000 [9 200–28 000]	1 300 [780–1 900]	9 800 [6 400–15 000]	63 200 [55 600–65 700]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,4 млн [1,3 млн–1,6 млн]	130 000 [120 000–150 000]	130 000 [120 000–150 000]	—*	34 000 [25 000–41 000]	520 000 [458 000–541 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	2,2 млн [1,9 млн–2,4 млн]	70 000 [57 000–84 000]	69 000 [57 000–83 000]	—*	13 000 [9 900–18 000]	1,7 млн [1,5 млн–1,8 млн]
Общемировые показатели	36,9 млн [31,1 млн–43,9 млн]	1,8 млн [1,4 млн–2,4 млн]	1,6 млн [1,3 млн–2,1 млн]	180 000 [110 000–260 000]	940 000 [670 000–1,3 млн]	21,7 млн [19,1 млн–22,6 млн]

* Оценочные данные о детях не публикуются из-за их небольшого числа.

Региональная антиретровирусная терапия в 2017 году

	Процент беременных женщин, получающих антиретровирусные препараты для предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку	Процент взрослых (старше 15 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	Процент детей (в возрасте 0—14 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	Процент всех людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию (всего)
Страны Восточной и Южной Африки	93% [73→95%]	66% [52–77%]	59% [45–77%]	66% [52→77%]
Азиатско-Тихоокеанский регион	56% [43–74%]	53% [37–71%]	71% [53→95%]	53% [37–72%]
Западная и Центральная Африка	48% [32–65%]	41% [26–57%]	26% [17–38%]	40% [25–55%]
Латинская Америка	73% [58–90%]	61% [43–80%]	55% [39–75%]	61% [43–79%]
Карибский бассейн	75% [58–95%]	58% [42–80%]	52% [39–80%]	57% [42–80%]
Ближний Восток и Северная Африка	22% [15–32%]	29% [17–43%]	35% [25–47%]	29% [17–43%]
Восточная Европа и Центральная Азия	—*	35% [28–40%]	—*	36% [29–41%]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	—*	78% [60–90%]	—*	78% [60–90%]
По всему миру	80% [61→95%]	59% [44–73%]	52% [37–70%]	59 [44–73%]

* Оценочные данные о детях не публикуются из-за их небольшого числа.

Контактная информация

Отдел по глобальной информационно-просветительской и коммуникационной работе | +41
22 791 1697 | communications@unaids.org

Дополнительная информация доступна по адресу: aidsinfo.unaids.org